

De *Observation Scale for Aggressive Behavior* (OSAB; Hornsveld, Nijman, Hollin, & Kraaimaat, 2007) meet geobserveerd gedrag op de afdeling. De schaal omvat 40 items, verspreid over de subschalen Irritatie/woede (bijvoorbeeld: 'Geprikkeld'), Angst/somberheid (bijvoorbeeld: 'Somber'), Agressief gedrag (bijvoorbeeld: 'Dreigen naar staf'), Prosocial gedrag (bijvoorbeeld: 'Geeft constructief kritiek op staf'), Antecedenten (bijvoorbeeld: 'Beperkende maatregel'), en Sancties (bijvoorbeeld: 'Patiënt moet excuses aanbieden'). De staf scoort de frequentie van het gedrag van de patiënt gedurende de afgelopen week op een vierpuntsschaal: 1 = 'niet', 2 = 'zelden', 3 = 'soms' en 4 = 'vaak'. In ons onderzoek gebruikten we de subschalen Irritatie/Woede, Agressief gedrag en Prosociaal gedrag. In een groep van 220 terbeschikkinggestelden bedroeg de interne consistentie (Cronbach's α) van deze subschalen respectievelijk .82, .79 en .93, de interbeoordelaar betrouwbaarheid .79, .81 en .70 en de test-hertest betrouwbaarheid .59, .57 en .76 (Hornsveld e.a., 2007). Convergente validiteit kon worden ondersteund door significante correlaties met overeenkomstige subschalen van de Forensic Inpatient Observation Scale (FIOS; Timmerman, Vastenburg, & Emmelkamp, 2001) en met zelfrapportage vragenlijsten over vijandigheid, woede en agressie (Hornsveld, Nijman, Hollin, & Kraaimaat, 2007).